



PATIENTENINFORMATION ZU EZETIMIB/BEMPEDOINSÄURE

Dieses Informationsblatt ersetzt nicht die Packungsbeilage des Medikamentes, sondern will lediglich praktisch relevante Informationen für den Umgang mit dem Medikament zusammenfassen.

Grund für die Verordnung des Medikamentes

Sie haben erhöhte Blutfettwerte und daraus erwachsende Gefäßerkrankungen. Die Einnahme eines weiteren Fettsenkers (Ezetimib und/oder Bempedoinsäure) ist wegen einer unzureichenden Wirkung oder einer Unverträglichkeit von Statinen notwendig und soll die Bildung des „schlechten“ Cholesterins (LDL-Cholesterin) im Körper vermindern und ein Voranschreiten der Gefäßschäden verzögern. Das Medikament ersetzt eine cholesterinarme Ernährung aber nicht.

Art der Einnahme

Sie können die verordnete Menge des Medikaments einmal täglich unabhängig von er Tageszeit oder der Nahrungsaufnahme einnehmen.

Typische Nebenwirkungen

Ezetimib kann zu Magenbeschwerden oder einem Anstieg der Leberwerte führen. Unter der Einnahme von Bempedoinsäure können ebenfalls erhöhte Leberwerte auftreten, zudem auch eine Erhöhung der Harnsäurewerte und dadurch zu vermehrten Gichtanfällen. Bei einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit darf der Fettsenker nicht weiter eingenommen werden.