



## **PATIENTENINFORMATION ZU MOXONIDIN**

**Dieses Informationsblatt ersetzt nicht die Packungsbeilage des Medikamentes, sondern will lediglich praktisch relevante Informationen für den Umgang mit dem Medikament zusammenfassen.**

### **Grund für die Verordnung des Medikamentes**

Sie haben wegen eines erhöhten Blutdrucks, der sich mit anderen Medikamenten allein bislang nicht senken ließ, zusätzlich das Medikament Moxonidin bzw. dessen Vorgänger Clonidin verordnet bekommen.

### **Art der Einnahme**

Nehmen Sie die Tabletten wie verordnet ein, Besonderheiten bei der Einnahme sind nicht zu beachten. Nehmen Sie insbesondere in der Anfangsphase selbst Blutdruckmessungen dreimal täglich vor und notieren Sie die Messwerte.

### **Typische Nebenwirkungen**

Die häufigste Nebenwirkung ist eine Mundtrockenheit. Gelegentlich kann es eine Neigung zu Wasseransammlungen in den Beinen geben. Andere Beschwerden (allgemeine Schwäche, Schwindel, Schwunglosigkeit) sind weniger Nebenwirkung als Ausdruck der blutdrucksenkenden *Wirkung* des Medikaments. Ihr Körper wird sich im Verlauf einiger Tage bis Wochen an die niedrigeren Blutdruckwerte gewöhnen. Ein abruptes Beenden der Behandlung kann zu einem überschießenden Blutdruckanstieg führen, so dass das Medikament ggf. schrittweise in seiner Dosis reduziert werden muss. Ferner gilt zu beachten, dass die Wirkung von Alkohol verstärkt werden kann.